

УДК 636.087.7:636.4

Сироватко К.М., кандидат с.-г. наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

ЖИТНЬО-ЛЮЦЕРНОВИЙ СИЛОС У ПОВНОЗМІШАНОМУ РАЦІОНІ ДІЙНИХ КОРІВ

В зв'язку з коливанням клімату, що спостерігається в останні роки, в практиці кормовиробництва виникли проблеми, пов'язані із зниженням урожайності кукурудзи та багаторічних трав на силос і сінаж – основних об'ємистих кормів дійних корів. Одним із шляхів забезпечення худоби кормами є використання на силос озимого жита, яке, добре використовуючи вологу зимового періоду, дає високі врожаї зеленої маси. Для підвищення протеїнової поживності та зниженням втрат поживних речовин при заготівлі та зберіганні силосу запропоновано силосувати прив'ялену сумішку озимого жита із люцерною у співвідношенні 65:35% із застосуванням біологічного консерванту «Бонсилаж альфа» у дозі 1,5 г на 1тонну силосної маси.

Встановлено, що житньо-люцерновий силос мав високу протеїнову поживність із вмістом сирого протеїну в 1 кг сухої речовини – 12,72 г, що на 4,92 г більше ніж у кукурудзяному силосі. Ступінь розщеплення сирого протеїну житньо-люцернового силосу була вищою і склада 72,2%, кукурудзяного – 69,2%.

За енергетичною поживністю житньо-люцерновий силос не поступався кукурудзяному – кількість обмінної енергії в 1 кг сухої речовини складала відповідно 9,41 та 9,37 МДж.

Використання консерванту «Бонсилаж альфа» сприяло нормалізації бродильних процесів при дозріванні житньо-люцернового силосу, накопиченні молочної кислоти, частка якої в силосі через 8 тижнів після закладання склада 68,5% від загальної маси кислот, тоді як у кукурудзяному силосі її вміст був нижчим – 62,3%.

Заміна в повнозмішаному раціоні дійних корів української чорно-рябої молочної породи 50% за енергетичною поживністю кукурудзяного силосу житньо-люцерновим, заготовленим із пров'ялених до вологості 70% трав з використанням бактеріального консерванту «Бонсилаж альфа», дозволила підвищити протеїнову поживність раціону на 228г (9,7%) за сирим протеїном та на 106 г (5,7%) за перетравним. За 30 діб дослідного періоду середньобобовий надій молока натуральної жирності зрос при згодовуванні житньо-люцернового силосу на 1,68 кг, або на 8,2%, молока базисної жирності – на 2,13 кг чи 9,4%. Жирність молока збільшилась на 0,04%, білковість – на 0,01%.

Ключові слова: силос житньо-люцерновий, консервант «Бонсилаж», дійні корови, протеїн, клітковина, суха речовина, надій молока

Табл. 3. Літ. 11.

Постановка проблеми. Протягом останніх років у нашій країні намітилася тенденція підвищення молочної продуктивності великої рогатої худоби. При цьому можна переконливо стверджувати, що тільки 30-40% цього росту обумовлено покращенням генетичних задатків поголів'я, а 60-70% досягнуто за рахунок підвищення повноцінності годівлі та умов утримання тварин [1].

В організації повноцінної годівлі ключову роль відіграє підвищення

обсягів заготівлі та покращення якості основних об'ємистих кормів – силосу і сінажу. Проте в останні роки в центральному Лісостепу намітилась тенденція зменшення кількості опадів та підвищення температурного режиму, що не дозволяє отримати високі врожаї кукурудзи та люцерни – основних вихідних культур для заготівлі силосу та сінажу. Альтернативою кукурудзяному силосу може стати силос із озимого жита, вирощеного як в чистих посівах та у суміші із бобовими та хрестоцвітими культурами [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В країнах Європи (Великобританії, Німеччині, Угорщині та ін.) все ширше практикують вирощування озимого жита гіbridних сортів на кормові цілі. Цьому сприяють такі якості культури, як невибагливість до ґрунтів, висока урожайність, скоростиглість, гнучкі терміни сівби. Жито вважається одним із самих посухостійких злаків: добре розвивається при опадах 400 мм, тоді як оптимальний рівень вологи для його розвитку – 600-1000 мм. Однією з переваг жита є ефективніше використання земельних ресурсів. Адже жито, використовуючи вологу осінньо-зимового періоду, скочується ранньою весною, що дозволяє отримати 2 врожаї з однієї площи. Встановлено, що використання жита на силос і сінаж завдяки високій урожайності дає змогу зменшити площу землі під кормовими культурами (із 1,2 до 0,7 га на корову) [3].

Основна роль озимого жита у кормовиробництві – це отримання якісного силосу з високим вмістом протеїну в сухій речовині (17-18%). В поєднанні з високоенергетичним та більш врожайним кукурудзяним силосом житній створює чудовий баланс в раціоні тварин.

За даними А. Білоуса [4] інтерес до заготівлі кормів із гіbridного жита пов'язаний з високим рівнем перетравності нейтрально-детергентної клітковини (НДК), високою концентрацією чистої енергії лактації та сирого протеїну. Це особливо важливо для молочного скотарства.

Науковцями встановлено, що житній силос, на відміну від кукурудзяного, швидше перетравлюється в рубці, знижуючи теплоутворення, тому в літній період він може ослабити вплив теплового стресу на корову. Також силос із жита містить значну кількість каротину, що позитивно впливає на відтворні функції тварин.

Отримати високоякісний силос із жита непросте завдання. Бродильні процеси дозрівання силосу, як стверджує Г.Ю. Лаптєєв [5], дуже недосконалі. Вони, залежно від виду сировини, техніки скочування, прив'язування, подрібнення, ущільнення, герметизації, призводять до втрат поживних речовин, які можуть сягати 25-40%, що не завжди забезпечує одержання доброякісного корму.

Одним із дієвих способів зниження втрат поживних речовини при заготівлі трав'яного та кукурудзяного силосу є застосування консервантів біологічної дії, до складу яких входять молочно-кислі, пропіоновокислі бактерії, ферменти целюлозолітичної та пектолітичної дії. За даними

Г.М. Дяченка та ін. [6] закваски, на основі молочнокислих бактерій, активно синтезуючи молочну кислоту, проявляють інгібуючий вплив на розмноження пліснявих грибів, маслянокислих і гнильних бактерій, швидко знижують кислотність корму до pH 4,4-4,5, яка є оптимальною для тривалого зберігання корму високої якості.

А.І. Овсієнко та ін. [7], встановлено, що при використанні у складі консервантів бактеріальних культур, які продукують оцтову, пропіонову кислоти та антитіла, сповільнюється розвиток дріжджів – основного збудника «аеробного псування» силосу. Тобто знижується повторна ферментація, що дає змогу зменшити втрати сухої речовини із 8-12 до 2-3%.

На сьогодні у кормовиробництві успішно зарекомендували себе вітчизняні біологічні препарати – Літосил, Літосил плюс, зарубіжні – Біотроф та Біовет (Росія), Бонсилаж та Біосил (Німеччина) та інші [8-10].

Метою наших досліджень було вивчити вплив біологічного консерванту «Бонсилаж Альфа» німецької фірми «Шауман» на якість та поживну цінність силосу із пров'яленої сумішки озимого жита та люцерни посівної та встановити ефективність його використання в годівлі дійних корів.

Методика дослідження. Дослідження проведено в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Вінницької області, де за траншеиною технологією було закладено у першій декаді травня житньо-люцерновий (65:35%) силос з консервантом «Бонсилаж Альфа» із розрахунку 1,5 г на 1 т сировини.

Консервант «Бонсилаж Альфа» містить $1,25 \times 10^{11}$ молочнокислих бактерій в 1 г (*Lactobacillus paracasei*; *Lactobacillus plantarum*; *Lactococcus lactis*; *Lactobacillus buchneri*). Гомоферментативні бактерії *Lactobacillus buchneri* перешкоджають перегріванню маси і таким чином покращують аеробну стабільність силосу. Гетероферментативні бактерії синтезують активно молочну кислоту на початку силосування, пригнічують розвиток маслянокислих бактерій (клостридій), забезпечує отримання силосу з вмістом повноцінного білка, що має позитивний вплив на його засвоєння.

Через 8 тижнів зразки силосу відправлені в лабораторію, де за допомогою біохімічних методів визначено вміст сухої, органічної речовини, протеїну, жиру, клітковини, золи, цукрів, органічних кислот та інші показники якості силосу.

Вплив житньо-люцернового силосу, заготовленого з біологічним консервантом, на молочну продуктивність досліджено методом періодів на 50 коровах української чорно-рябої породи першої половини лактації. Молочна продуктивність корів на початку досліду склала 20 кг, вік – 2-3 лактація.

Дослід поділений на 2 періоди, тривалістю 30 діб кожний. У перший період коровам згодовували повнозмішаний раціон, до складу якого входив силос кукурудзяний, заготовлений у минулій рік без застосування консерванту, у другий період 50% кукурудзяного силосу за енергетичною поживністю замінено житньо-люцерновим силосом, заготовленим з біологічним

консервантом «Бонсилаж альфа».

Облік надсінного молока проводили щоденно, відбір зразків для визначення вмісту жиру і білку – один раз в 10 днів під час проведення контрольного доїння з допомогою приладу Екомілк.

Результати дослідження. У фермерському господарстві Щербич всі технологічні операції силосування спрямовані на забезпечення оптимальних умов молочно-кислого бродіння. Скошування жита проводилось у фазу початку колосіння, люцерни – у фазу бутонізації. Висота скошування трав – на рівні 6-7 см від поверхні землі. В цей період розвитку вологість сировини складала 81-82%, тому її пров'ялювали протягом 1 доби до досягнення вологості 70%. Пров'ялені трави підбирали, подрібнювали до довжини різки 2-3 см, закладали в траншею. Бактеріальний препарат «Бонсилаж альфа» вносили за допомогою дозаторів, встановлених на кормозбиральному комбайні. Силос ретельно трамбували, забезпечуючи щільність трамбування 600 кг/м³ та накривали поліетиленовою плівкою.

Дозрівання силосу, як відомо, триває не менше 3 тижнів і включає 3 фази: аеробну, анаеробну і стабільну. Аеробна фаза була дуже короткою, оскільки сировину закладали в траншею в стислі строки, протягом 1 доби. Це, позитивно вплинуло на органолептичні і біохімічні показники якості силосу. Житньо-люцерновий силос мав зелений колір, ароматний кисло-молочний смак.

За даними хімічного аналізу було виявлено, що додавання консерванту позитивно вплинуло на збереження поживних речовин, як наслідок, житньо-люцерновий силос, заготовлений з біологічним консервантом, маввищу протеїнову та енергетичну поживність (табл. 1).

Порівнюючи хімічний склад силосу кукурудзяногота житньо-люцернового потрібно відмітити, що силос із жита та люцерни маввищу протеїнову поживність. Так вміст сирого протеїну з розрахунку на 1 кг сухої речовини у кукурудзяному силосі склав 7,80%, у житньо-люцерновому – 12,72%, розщеплюваність сирого протеїну становила відповідно – 69,2 та 72,2.

Житньо-люцерновий силос маввищий вміст сирої клітковини та сирої золи, що обумовлено запізненням із строками косіння жита – на початку колосіння. Для зниження вмісту клітковини та сирої золи доцільно скошування жита проводити у фазу виходу у трубку. Щоб звести до мінімуму забруднення корму ґрунтом, та забезпечити краще його підв'ялювання бажано збільшити висоту зрізу рослин до 8-10 см.

У житньо-люцерновому силосі сума органічних кислот на 16,1% була нижчою, порівняно із кукурудзяним силосом, що обумовлено нижчим вмістом легкорозчинних вуглеводів злаково-бобової сумішки. Однак співвідношення органічних кислот було кращим, що обумовлено застосуванням бактеріального консерванту. Зокрема, частка молочної кислоти у житньо-люцерновому силосі складала 68,5% від загальної маси кислот, тоді як у кукурудзяному силосі

становила 62,3%. Енергетична цінність сухої речовини обох видів силосу була майже однаковою: 9,37 та 9,41 МДж обмінної енергії.

Таблиця 1

**Біохімічний склад кукурудзяного та житньо-люцернового силосів у ФГ «Щербич»
Літинського району**

Показник	Силос кукурудзяний (без консерванту)	Силос житньо-люцерновий з консервантом «Бонсилаж альфа» 1,5 г на 1т
Суха речовина, %	31,80	30,82
Органічна речовина, %	30,49	28,93
Сирий протеїн, %	2,48	3,92
Розщеплюваність сирого протеїну, %	69,23	72,56
Перетравний протеїн, %	1,46	2,24
Сира клітковина, %	7,80	9,17
Сирий жир, %	0,92	0,96
БЕР, %	19,29	14,88
Сира зола, %	1,38	1,89
pH	4,0	4,4
Сума органічних кислот, %	2,23	1,87
в т.ч. молочна кислота, %	1,39/62,3	1,35/68,5
оцтова кислота, %	37,7	31,5
масляна кислота, %	-	-
Обмінна енергія: МДж/1 кг	2,98	2,90
МДж/1 кг СР	9,37	9,41

В господарстві застосовується однотипна годівля корів, з використанням повно-змішаних сумішок (раціонів), які згодовують тваринам з кормових столів. В літній період у склад раціону не включають зелену масу, використовують корми стійлового періоду – сіно, силос, концентровані корми. За даними І.В. Гноєвого [11], цілорічна однотипна годівля, коли корми на ферму надходять не з поля, а тільки зі скринь, підвищує ефективність використання кормових культур, дозволяє уникнути перехідних періодів у годівлі тварин, при цьому виробництво молока з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зростає на 27,5%.

Змішування та роздавання кормів на кормові столи проводиться кормороздавачем «KUHN». В господарстві застосовують європейську технологію приготування повнозмішаного раціону – compact TMR, при якій вологість суміші становить 60%. При застосуванні такої технології, зменшується сортування компонентів, а тому збільшується поїдання грубоволокнистих кормів. Приготування кормової суміші здійснюється таким чином: спочатку завантажують концентровані корми та кормові добавки, рівномірно додається вода по всьому змішувачу у співвідношенні 1:1, залишається на 1 годину, щоб концентрати максимально ввібрали воду, потім додається попередньо подрібнене сіно до довжини різки 7-9 см, змішується з

зволоженими концентрованими кормами протягом 20-25 хв, після цього додається силос, меляса та ретельно перемішується ще 20-25 хв.

Структура раціону дійних корів (за сухою речовиною) під час проведення досліджень була такою: об'ємисті корми – 54,5%, в тому числі силос – 46,5%, концентровані – 45,5%, в т. ч. макуха соняшникова – 16,6% (табл. 2).

При заміні 50% силосу кукурудзяного за енергетичною поживністю на силос житньо-люцерновий вміст сирого протеїну в раціоні збільшився на 228г (9,7%), перетравного – на 106 г (5,7%). Протеїнова поживність 1 кг сухої речовини склала за сирим і перетравним протеїном відповідно 149 та 112,7 г, при рівні 135,9 та 106,6 г в раціоні контрольного періоду. Рівень клітковини в сухій речовині був оптимальним для високопродуктивних корів. Незначне підвищення клітковини – до 18,8%, навпаки, мало позитивний вплив на процеси рубцевої ферментації та синтез складових частин молока. Вміст жиру та легкорозчинних вуглеводів в сухій речовині, відношення кальцію до фосфору було в межах норми протягом обох періодів.

Таблиця 2

Раціони дійних корів живою масою 550 кг, середньодобовим надоєм 20-24 кг

Показник	Періоди досліду, їх тривалість	
	I-й – 30 діб	II-й – 30 діб
Склад раціону, кг:		
сіно злакове	1	1
силос житньо-люцерновий	-	15
силос кукурудзяний	29	14,5
дерть пшенична	2,25	2,25
кукурудза	2,5	2,5
макуха соняшникова	3	3
меляса	0,5	0,5
премікс CNV korm	0,15	0,15
крейда	0,08	0,08
сіль кухонна	0,08	0,08
У раціоні міститься:		
сухої речовини, кг	17,29	17,30
обмінної енергії, МДж/кг	183,7	183,9
обмінної енергії, МДж/кг СР	10,62	10,63
сирого протеїну, г/кг	2349,1	2577,0
сирого протеїну г/1 кг СР	135,9	149,0
перетравного протеїну, г/кг	1844	1950
перетравного протеїну, г/1 кг СР	106,6	112,7
перетравного протеїну, г /1 ЕКО	100,4	106,0
сирої клітковини, г/кг	3016,3	3260,8
сирої клітковини, %/СР	17,4	18,8
сирого жиру, г/кг	678,3	693,3
сирого жиру, %/СР	3,9	4,0
Крохмаль+цукор %/СР	2,29	2,13
Ca/P	1,83	1,84

Раціони корів силосно-концентратного типу. Силос сам по собі містить значну кількість органічних кислот, концентрати багаті вуглеводами, які легко гідролізуються у рубці з утворенням летких жирних кислот. Для нормалізації Рн у рубці та попередження ацидозів і кетозів до складу раціону вводився природний буфер – харчова сода (бікарбонат натрію) з розрахунку 100 г на голову на добу. Буфери допомагають підтримувати у рубці сприятливе середовище для перетравлення кормів і росту бактерій.

Доведено, що між вмістом органічних кислот у силосі і його споживанням існує пряма залежність – із збільшенням кількості кислот споживання знижується. Корови можуть споживати із силосом близько 1 г органічних кислот на 1 кг живої маси. В першому періоді досліду корови отримували із силосом 647 г органічних кислот, або 1,18 г на 1 кг живої маси. У другому періоді досліду надходження з силосом органічних кислот зменшилось на 43 г і склало 604 г, що мало позитивний вплив на засвоєння поживних речовин кормів і їх продуктивну дію.

Показники продуктивності корів при заміні кукурудзяного силосу житньо-люцерновим наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Продуктивність корів та якість молока при заміні в складі раціону кукурудзяного силосу житньо-люцерновим

Показник	Періоди досліду	
	I (контрольний)	II (дослідний)
Валовий надій натурального молока, кг	30720,36±298,24	33239,97±247,29*
Середньодобовий надій натурального молока, кг	20,48±0,31	22,16±0,34*
Середній вміст жиру в молоці, %	3,78 ±0,08	3,82±0,05
Валовий надій молока базисної жирності, кг	34153,98±322,18	37349,08±242,11**
Середньодобовий надій базисної жирності, кг	22,77±0,32	24,90±0,23**
Вміст білку, %	3,17±0,01	3,18±0,02
Затрати корму на 1 кг молока, МДж ОЕ:		
натуральної жирності	8,97	8,30
базисної жирності	8,07	7,38

При згодовуванні житньо-люцернового силосу, заготовленого з консервантом «Бонсилаж альфа», середньодобовий надій молока натуральної жирності зрос на 1,68 кг (8,2%) при збільшенні вмісту жиру на 0,04%. Збільшення середньодобового надою у перерахунку на базисну жирність склало 2,13 кг (9,4%) ($P\leq 0,01$). Витрати кормів на 1 кг молока натуральної жирності знизились на 0,67 МДж обмінної енергії.

Висновки. 1. Використання біологічного консерванту «Бонсилаж альфа» при консервуванні прив'яленої сумішки озимого жита з люцерною посівною дозволяє отримати силос високої якості, який за енергетичною поживністю не

поступається кукурудзяному силосу, а за вмістом сирого протеїну у сухій речовині перевищує його на 12,72%.

2. Заміна 50% за енергетичною поживністю кукурудзяного силосу житньо-люцерновим забезпечила підвищення середньодобових надоїв корів та середнього вмісту жиру в молоці на 1,68 кг та 0,04%.

Перспективами подальших досліджень є вивчення біохімічних показників якості та продуктивної дії житньо-люцернового силосу, заготовленого без пров'ялення з використанням консерванту «Бонсилаж форте».

Список використаної літератури

1. Ібатулін І.І. Порівняльна характеристика типів годівлі худоби молочного напрямку продуктивності. *Наукові доповіді НУБіП*. 2011. Вип. 24. С. 132-147.
2. Давидюк І. Гіbridne жито-якісний сінаж для молочних корів. *Agroexpert*. 2016. № 5. С. 94-95.
3. Висоцький І. Житній сінаж-оптимальний інгредієнт раціону для корів. *Agroexpert*. 2016. № 3. С. 92-93.
4. Білоус А . Жито – альтернативний грубий корм. *Молоко і ферма*. 2018. № 3. С. 46-47.
5. Лаптев Г.Ю. Потери при силосуванні кормов в основном устранимы. *Сельскохозяйственные вести*. 2006. № 2. С. 25.
6. Дяченко Г.М. Біотехнологія у кормовиробництві: стан і перспективи розвитку. *Сільськогосподарська мікробіологія*. 2010. № 11. С 117-122.
7. Овсієнко А.І. Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю. *Корми і кормовиробництво*. 2017. Вип. 83. С. 154-160.
8. Йорг Вінкельман, Використання консервантів для силосування кукурудзи. *Agroexpert*. 2014. № 6. С. 100-102.
9. Попсуй В., Опара В. Які корми без консервантів? *Agroexpert*. 2015. № 5. С. 92-95.
10. Чумаченко С.П., Федак Н.М, Кравченко Н.О., Божок Л.В. Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів. *Передгірне та гірське землеробство і тваринництво*. 2014. № 56(2). С. 222-232.
11. Гноєвий І.В. Ефективність застосування консервованих кормів за пріоритетними технологіями їх заготовлі в годівлі великої рогатої худоби. *Агропромислове виробництво Полісся*. 2013. Вип. 5. С. 122-124.

References

1. Ibatullin, I.I., Panasenko, Yu.O. & Yatsenko, V.O. (2011). Porivnyal'na kharakterystyka typiv hodivli khudoby molochnoho napriamku produktyvnosti [Comparative characteristics of productivity of dairy cattle feeding types]. *Naukovi dopovidi NUBiP – Scientific reports of NULESU*, 24, 132-147 [in Ukrainian].
2. Davydyuk, I. (2016). Hibrydne zhyto – yakisnyy sinazh dlya molochnykh koriv [Hybrid rye is a quality hay for dairy cows]. *Agroexpert –Agroexpert*, 5, 94-95 [in Ukrainian].
3. Vysots'kyi, I. (2016). Zhytnii sinazh - optymalnyi inhrydilient ratsionu dlia koriv [Rye hay is an optimal feed ingredient for cows]. *Agroexpert – Agroexpert*, 3, 92-93 [in Ukrainian].
4. Bilous, A. (2018). Zhyto – alternatyvnyi hrubyi korm [Rye is an alternative coarse feed]. *Moloko i ferma – Milk and Farm*, 3, 46-47 [in Ukrainian].

-
5. Laptev, H.Yu. (2006). Poteri pri silosovanii kormov v osnovnom ustranimyi [Losses during silage of feeds are mainly eliminated]. Sel'skokhozyaystvennyye vesti – Agricultural News, 2, 25-26 [in Russian].
 6. Dyachenko, H.M. & Kravchenko, N.O. (2010). Biotekhnolohiia u kormovyyrobnytstvi: stan i perspektivy rozvytku [Biotechnology in forage production: state and prospects of development]. Sil's'kohospodars'ka mikrobiolohiia – Agricultural Microbiology, 11, 117-122 [in Ukrainian].
 7. Ovsyienko, A.I., Bezpalko, A.V. & Ovsyienko, S. M. (2017). Zahotivlia i vykorystannia sylosu z vysokoiu aerobnoiu stabilnistiu [Harvesting and use of silo with high aerobic stability]. Kormy i kormovyyrobnytstvo – Feeds and forage production, 83, 154-160 [in Ukrainian].
 8. Vinkelman, I. (2014). Vykorystannia konservantiv dla sylosuvannia kukurudzy [The use of preservatives for corn silage]. Agroexpert – Agroexpert, 6, 100-102 [in Ukrainian].
 9. Popsui, V. & Opara, V. (2015). Yaki kormy bez konservantiv [What feeds are without preservatives]. Agroexpert – Agroexpert, 5, 92-95 [in Ukrainian].
 10. Chumachenko S.P., Fedak, N.O., Kravchenko, N.O. & Bozhok, L.V. (2014). Probiotychni preparaty u sylosuvanni zelenykh kormiv [Probiotic preparations for green forages silage]. Peredhirne ta hirs'ke zemlerobstvo i tvarynnystvo – Foothills and mountain farming and animal husbandry, 56 (2), 222-232 [in Ukrainian].
 11. Hnoievyi, I.V. (2013). Efektyvnist zastosuvannia konservovanykh kormiv za priorytetnymy tekhnolohiiamy yikh zahotivli v hodivli velykoi rohatoi khudoby [Efficiency of canned feeds utilization harvested by priority technologies for cattle feeding]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissia – Agroindustrial production of Polissia, 6, 122-124 [in Ukrainian].
-

АННОТАЦИЯ

РЖАНО-ЛЮЦЕРНОВЫЙ СИЛОС В ПОЛНОСМЕШАННОМ РАЦИОНЕ ДОЙНЫХ КОРОВ

Сыроватко Е.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Винницкий национальный аграрный университет

В связи с колебанием климата, что наблюдается в последние годы, в практике кормопроизводства возникли проблемы, связанные с снижением урожайности кукурузы и многолетних трав на силос и сенаж – основных объемистых кормов дойных коров. Одним из путей обеспечения скота кормами является использование на силос озимой ржи, которая, хорошо используя влагу зимнего периода, дает высокие урожаи зеленой массы. Для повышения протеиновой питательности и снижением потерь питательных веществ при заготовке и хранении силоса предложено силосовать проявленную смесь озимой ржи с люцерной в соотношении 65: 35% с применением биологического консерванта «Бонсилаж альфа» в дозе 1,5 г на 1тонну силосной массы.

Установлено, что ржано-люцерновый силос имел высокую протеиновую питательность с содержанием сырого протеина в 1 кг сухого вещества – 12,72 г, что на 4,92 г больше чем в кукурузном силосе. Степень расщепления сырого протеина ржано-

люцернового сілоса була вище і складала 72,2%, кукурудзного – 69,2%.

По енергетичній питомійноти ржано-люцерновий сілос уступал кукурудзному – кількість обмінної енергії в 1 кг сухого відходу складала відповідно 9,41 і 9,37 МДж.

Использование консерванта «Бонсилаж альфа» способствовало нормализации бродильных процессов при созревании ржано-люцернового сілоса, накоплению молочной кислоты, доля которой в сілосе через 8 недель после закладки складала 68,5% от общей массы кислот, тогда как в кукурудзном сілосе її содережання було нижче – 62,3%.

Замена в полносмешанном рационе дойных коров української чорно-рябої молочної породи 50% по енергетичній питомійноти кукурудзного сілоса ржано-люцерновим, заготовленним з провялених к вологості 70% трав з використанням бактеріального консерванта «Бонсилаж альфа», дозволила підвищити протеїнову питомійноту рациона на 228 г (9,7%) по сырому протеїну і на 106 г (5,7%) по переваримому. За 30 днів учищного періоду опыта среднесуточний надой молока натуральної жирності виріс при скармливанні ржано-люцернового сілоса на 1,68 кг, або на 8,2%, молока базисної жирності – на 2,13 кг або 9,4%. Жирність молока зросла на 0,04%, білковість – на 0,01%.

Ключевые слова: сілос ржано-люцерновий, консервант «Бонсилаж», дойные коровы, протеїн, клетчатка, сухое відходу, надой молока

Табл. 3. Лит. 11.

ANNOTATION
RYE-ALFALFA SILAGE IN A FULLY MIXED DIET OF MILKING COWS

Syrovatko K.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Vinnytsia National Agrarian University

Nowadays there are problems associated with the decline in corn yield and perennial grasses for silage and haying as the main bulky forage of milking cows caused by recent climate fluctuations observed in years. In order to provide livestock with feed it is recommended to use winter rye silage. It gives high yields of green mass. In order to increase protein nutrition and reduce nutrient losses during silo harvesting and storage, it is proposed to silage 65% to 35% of winter rye with alfalfa using 1.5 g of biological preservative «Bonsilag alfa» per 1 ton.

It was proved that the rye-alfalfa silage had high protein nutrition with a 12.72 g crude protein content per 1 kg of dry matter; it is 4.92 g more than in the corn silage. The degree of cleavage of crude protein of rye-alfalfa silage was higher and amounted to 72.2%, and corn silage has 69.2%.

In terms of energy nutrition, the rye-alfalfa silage was not inferior to maize; the amount of exchange energy per 1 kg of dry matter was 9.41 and 9.37 MJ, respectively.

The «Bonsilag alfa» preservative promoted the normalization of fermentation processes in the maturation of rye-alfalfa silage, the accumulation of lactic acid, whose share was 68.5% of the total weight of acids after 68 weeks, its content (62.3%) in corn silage was lower.

Replacement of corn silage by rye-alfalfa one made from herbs with 70% humidity with the use of the bacterial preservative «Bonsilag alfa» in the fully mixed diet of Ukrainian black-and-white dairy breed cows allowed to increase protein by 228 g (9.7%) for crude protein and 106 g

(5.7%) for digestible protein. During the 30 days of the experimental period, the average daily yield of milk fat increased by 1.68 kg or 8.2%, and by 2.13 kg or 9.4%. The fat content of milk increased by 0.04%, and the protein content by 0.01%.

Keywords: rye-alfalfa silage, Bonsilag preservative, dairy cows, protein, fiber, dry matter, milk yields

Tabl. 3. Ref. 11.

Інформація про авторів

СИРОВАТКО Катерина Максимівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; e-mail: makcimovna@ukr.net)

СЫРОВАТКО Екатерина Максимовна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры кормления сельскохозяйственных животных и водных биоресурсов Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3; e-mail: makcimovna@ukr.net)

SYROVATKO Catherine, Candsidat of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of feeding farm animals and water bioresources, Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnytsia, 3, Soniachna Str.; e-mail: makcimovna@ukr.net)