

УДК 636.03:636.2:636.082:637.04

Поліщук Т.В., кандидат с.-г. наук, доцент  
Вінницький національний аграрний університет

## **ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК І МІНЛІВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАКТАЦІЇ**

Досліджено взаємозв'язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації. Установлено залежність даних показників і їх вірогідну зміну залежно від лактації. Надій корів шостої лактації був на 15%вищим, порівняно з цим показником у корів першої лактації ( $P<0,001$ ) та на 1,8%вище, порівняно з надоєм корів п'ятої лактації. Сильним, прямим, достовірним зв'язком характеризується кореляція між тривалістю лактації та тривалістю сервіс-періоду ( $r=0,69*-0,88^{***}$ ), тісним, прямим, вірогідним – між тривалістю міжстельного періоду та тривалістю лактації в межах  $0,69*-0,89^{***}$ , зворотнім і тісним – зв'язок між коефіцієнтом відтворювальної здатності та тривалістю лактації ( $r=-0,69*-0,88^{***}$ ). Дано закономірність свідчить, що із збільшенням тривалості лактації збільшується тривалість сервіс-періоду та міжстельного періоду, але зменшується КВЗ. Установлено, що з підвищенням надою у корів другої лактації знижується коефіцієнт запліднювальної здатності ( $r=-0,73^*$ ) та збільшується тривалість сервіс-періоду. Найбільший прибуток на одну корову був у тварин третьої і шостої лактації та становив 3,24 і 3,34 тис. грн. за лактацію відповідно. Із підвищенням молочної продуктивності корів спостерігається тенденція до зниження їх відтворювальної здатності. Тому, для одержання господарством максимально можливого прибутку та раціонального ведення молочного скотарства необхідно враховувати залежність закономірностей зв'язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної здатності.

**Ключові слова:** ознаки, взаємозв'язок, мінливість, корови, молочна продуктивність, відтворювальна здатність, надій, економічна ефективність, прибуток

Табл. 7. Літ. 10.

**Постановка проблеми.** Підвищення молочної продуктивності корів – основне завдання селекції у молочному скотарстві. На збільшення молочної продуктивності впливає багато факторів, серед яких і відтворювальна здатність молочної худоби. Успішне ведення молочного скотарства залежить від знання закономірностей зв'язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної здатності.

В Україні розводять багато високопродуктивних і економічно вигідних порід великої рогатої худоби, які знаходиться на стадії консолідації генотипової структури, підвищення продуктивності та поліпшення їх відтворювальної здатності.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми.**

Зростання продуктивності корів української червоно-рябої породи можливе лише за поєднання нарощування генетичного потенціалу засобами сучасної селекції та біотехнології із раціонального використання молочної худоби має базуватися на знанні біологічних закономірностей функціонування живого

організму. До таких закономірностей відносяться й закономірності зв'язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної здатності худоби. Молочна продуктивність корів тісно пов'язана з їх відтворювальною здатністю: з підвищеннем молочної продуктивності корів їх відтворювальна здатність у цілому погіршується. Проявляється це в збільшенні тривалості сервіс-періоду, міжотельного періоду та індексу осіменіння, що негативно впливає на економічну ефективність ведення молочного скотарства [1].

Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів червоної молочної породи в розрізі лактацій супроводжується зростанням напруженості біосинтетичних процесів, що є причиною погіршення відтворювальної функції (тривалість I-III лактацій складає 396,55-432,71 днів). Однією з причин цього є недостатня забезпеченість корів I-III лактацій поживними і мінеральними речовинами та енергією в середньому на 8,98%, що зумовлює підвищену мобілізацію власних ліпопротеїдних комплексів. Кореляція між віком першого осіменіння та рівнем молочної продуктивності і жирномолочності корів, починаючи з III лактації, коливалася від 0,201 до 0,824, між живою масою при першому осіменінні та показниками молочної продуктивності, в межах від 0,100 до 0,4585 [2].

Іншими дослідженнями установлено, що формування молочної продуктивності корів симентальської породи також залежало показників їх відтворювальної здатності. Найвищі надої та кількість молочного жиру були відмічені у тварин з віком першого осіменіння 18,1-20,0 місяців, з віком першого отелення – 27,1-29,0 місяців, з тривалістю сервіс-періоду – 101-120 днів та з тривалістю міжотельного періоду – 381-400 днів. Між показниками відтворювальної здатності та надоєм корів вставлені додатні високовірогідні зв'язки. Сила впливу вищезазначених показників на надій знаходилася в межах 23,13-39,88; 28,63-45,02; 30,98-35,17% відповідно [3].

У дослідженнях С. Федоровича, З. Щербатого, П. Бондара [4] було визначено частку впливу тривалості сервіс-періоду на надій та кількість молочного жиру. Проведений ними дисперсійний аналіз свідчить, що з усіх досліджуваних показників репродуктивної здатності корів найвищий вплив на молочну продуктивність мала тривалість сервісперіоду. Так, частка впливу цього показника на надій становила 23,78, а на кількість молочного жиру – 23,92% при  $P<0,001$  в обох випадках. У той же час частка впливу тривалості міжотельного періоду на зазначені показники становила 13,19 ( $P<0,001$ ) і 13,38% ( $P<0,001$ ), а тривалості сухостійного періоду – 2,76 ( $P<0,01$ ) і 2,82% ( $P<0,01$ ) відповідно. Найвищі коефіцієнти кореляції спостерігалися між віком першого отелення тварин та їх надоєм і залежно від лактації становили 0,380–0,498, дещо менші – між віком першого осіменіння та надоєм – 0,316-0,456 і найменші – між тривалістю сервіс- і міжотельного періодів та надоєм – відповідно 0,124-0,335; 0,127-0,331.

Дослідженнями М.І. Гиля, І.А. Галушко, О.І. Каратеєвої, Ю.Ф. Дехтяра [5] установлено, що між вмістом жиру та основними характеристиками відтворювальної здатності корів різних типів розвитку існує тільки позитивна кореляція від +0,04 до +0,25. Чіткої залежності між надоєм та відтворювальною здатністю корів представлена тривалістю міжотельного, сухостійного та сервіс-періодами в розрізі типів формування організму не встановлено. Існує залежність між певними господарсько корисними відтворювальними ознаками але не відмічається чіткого впливу синтетичних процесів під час формування організму у процесі росту та розвитку.

Вивченням впливу генотипних факторів на продуктивність у м'ясному і молочному скотарстві, дослідженням зв'язків продуктивних ознак і відтворювальних якостей займалися ряд інших учених [6-10].

**Метою досліджень** було вивчення взаємозв'язку та мінливості показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

- проаналізувати показники молочної продуктивності корів та живої маси залежно від лактації;
- провести оцінку показників відтворювальної здатності корів у залежності від лактації;
- встановити взаємозв'язок молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів;
- визначити економічну ефективність результатів досліджень;
- на основі комплексної оцінки експериментальних даних запропонувати виробництву обґрунтовані пропозиції.

Об'ектом дослідження були корови української чорно-рябої молочної породи.

Предметом дослідження були показники молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів.

**Матеріали і методика досліджень.** Дослідження проводилось на базі фермерського господарства «Щербич», що знаходиться в селі Багринівці Літинського району Вінницької області.

Для вивчення взаємозв'язку і мінливості показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації було оцінено і сформовано шість дослідних груп за принципом аналогів по 10 корів української чорно-рябої молочної породи різних лактацій, серед яких тварини 1, 2, 3, 4, 5 і 6 лактацій.

У межах кожної групи досліджували взаємозв'язок між показниками молочної продуктивності (надій і тривалість лактації) та відтворювальної здатності (тривалість сервіс, міжотельного, сухостійного періодів, коефіцієнт відтворювальної здатності).

Усі корови утримувались на одному рівні, типі годівлі та однаковій структурі рационів у однакових умовах утримання.

Для характеристики відтворювальної здатності корів використовувався коефіцієнт відтворювальної здатності, який визначався на основі тривалості міжотельного періоду. Для його розрахунку використовувалась формула:

$$КВЗ = \frac{365}{МОП} (1)$$

де, КВЗ – коефіцієнт відтворювальної здатності, МОП – тривалість міжотельного періоду, 365 – кількість днів у році. Щоб оцінити взаємозв'язок між різними показниками розраховувався коефіцієнт кореляції та похибка коефіцієнта кореляції.

Біометричну обробку отриманих результатів здійснювали методом варіаційної статистики за методикою М.О. Плохинського (1969) [10].

**Результати досліджень та їх обговорення.** Проведеними дослідженнями встановлено, що показники молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи певною мірою залежать від відтворювальної здатності.

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що мінливість показників молочної продуктивності значно нижче, порівняно з мінливістю показників відтворювальної здатності, та знаходиться в межах 0,1-16,1%.

Таблиця 1

**Мінливість показників молочної продуктивності та живої маси корів залежно від лактації**

Показник	$\bar{X}$	$\sigma$	$Cv$
Лактація 1, n=10			
Тривалість лактації, днів	336,3	34,6	10,3
Надій, кг	6163,1	197,5	3,2
Жива маса, кг	502	5,5	1,1
Лактація 2, n=10			
Тривалість лактації, днів	315,4	16,5	5,2
Надій, кг	6523,2	255,0	3,9
Жива маса, кг	551,4	5,4	0,1
Лактація 3, n=10			
Тривалість лактації, днів	351,3	28,2	8,0
Надій, кг	7096,8	206,7	2,9
Жива маса, кг	611,8	15,7	2,6
Лактація 4, n=10			
Тривалість лактації, днів	371,7	43,6	11,7
Надій, кг	6736,7	147,2	2,2
Жива маса, кг	605,5	11,8	1,9
Лактація 5, n=10			
Тривалість лактації, днів	337,2	29,8	8,8
Надій, кг	6850,0	287,7	4,2
Жива маса, кг	613,9	11,3	1,8
Лактація 6, n=10			
Тривалість лактації, днів	341,6	54,9	16,1
Надій, кг	7312,7	302,3	4,1
Жива маса, кг	614,7	11,1	1,8

Коефіцієнт мінливості надою корів залежно від лактацій знаходився в межах 2,2-4,2% (слабка мінливість ознаки), тривалості лактації – в межах 5,2-16,1% (середня мінливість ознаки), мінливість живої маси у корів різних лактацій знаходився в межах 0,1-2,6% (слабка мінливість ознаки).

Аналізуючи данні таблиці 2 можна зробити висновок, що показники відтворюальної здатності мають більшу мінливість порівняно з молочною продуктивністю.

*Таблиця 2*

**Мінливість показників відтворюальної здатності корів залежно від лактації**

Показник	$\bar{X}$	$\sigma$	$Cv$
<b>Лактація 1, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	285,0	0,5	0,2
Тривалість сервіс-періоду, днів	71,6	9,7	13,6
МОП, днів	364,2	10,9	3,0
Тривалість сухостійного періоду, днів	80,7	8,8	10,9
КВЗ	0,86	0,1	10,5
<b>Лактація 2, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	285,2	0,8	0,3
Тривалість сервіс-періоду, днів	83,1	8,73	10,50
МОП, днів	368,3	27,7	7,5
Тривалість сухостійного періоду, днів	52,9	7,56	14,30
КВЗ	1,0	0,1	8,00
<b>Лактація 3, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	284,9	0,3	0,2
Тривалість сервіс-періоду, днів	89,8	7,6	8,5
МОП, днів	380,2	9,5	2,5
Тривалість сухостійного періоду, днів	58,3	3,3	5,7
КВЗ	0,9	0,1	8,8
<b>Лактація 4, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	285,1	0,7	0,1
Тривалість сервіс-періоду, днів	75,4	10,8	14,4
МОП, днів	352,2	9,8	2,8
Тривалість сухостійного періоду, днів	86,5	16,5	18,0
КВЗ	0,8	0,1	8,9
<b>Лактація 5, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	285	1,1	0,4
Тривалість сервіс-періоду, днів	84,9	8,7	10,3
МОП, днів	359,6	10,4	2,9
Тривалість сухостійного періоду, днів	74,2	18,2	24,5
КВЗ	0,9	0,1	9,0
<b>Лактація 6, n=10</b>			
Тривалість тільності, днів	285,1	1,2	0,4
Тривалість сервіс-періоду, днів	83,5	11,5	12,8
МОП, днів	372,9	10,8	2,9
Тривалість сухостійного періоду, днів	72,8	15,6	21,4
КВЗ	0,9	0,1	12,4

Для показника тривалості тільності коефіцієнт варіації знаходився у межах 0,1-0,4% (слабка мінливість ознаки).

Мінливість ознаки тривалості сервіс-періоду у корів залежно від лактації знаходилась у межах 8,5-14,4% (середня мінливість ознаки), міжотельного періоду – 2,5-7,3% (середня мінливість ознаки), сухостійного періоду – 5,7-24,5% (сильна мінливість ознаки), коефіцієнта відтворювальної здатності – 8,0-12,4% (середня мінливість ознаки).

Отже, слабкою мінливістю характеризуються показники надою корів, тривалості лактації, живої маси і тривалості тільності. Показники відтворювальної здатності, серед яких тривалість сервіс-періоду, міжотельного періоду, сухостійного періоду, коефіцієнта відтворювальної здатності характеризуються середньою і сильною мінливістю ознак.

Аналізуючи дані таблиці 3, у якій представлено зміну показників молочної продуктивності залежно від лактації, ми спостерігаємо, що за такими показниками, як тривалість лактації вірогідної різниці між піддослідними тваринами не встановлено.

Таблиця 3

**Зміна показників молочної продуктивності залежно від лактації,  $\bar{X} \pm S_x$**

Показник	Лактації					
	1, n=10	2, n=10	3, n=10	4, n=10	5, n=10	6, n=10
Тривалість лактації, днів	336,3±10,96	315,4±5,14	351,3±8,91	371,7±13,80	337,2±9,41	341,6±17,37
Надій, кг	6163±62,4	6523±80,6**	7096±65,3**	6736±46,5***	6850±90,9***	7312±95,59***
Жива маса, кг	502±1,70	551,4±1,70***	611,8±4,95***	605±3,7***	613,9±3,56***	614,7±3,50***

Примітки: \*  $P<0,05$ ; \*\*  $P<0,01$ ; \*\*\*  $P<0,001$ , порівняно з показниками корів першої лактації

Дослідженнями встановлено, що надій корів другої лактації достовірно переважав за даним показником корів першої лактації на 5,5% при  $P<0,01$ . Перевага корів третьої лактації становила 13,0% ( $P<0,01$ ), порівняно із надоєм корів першої лактації, і на 8%, порівняно із надоєм корів другої лактації. Показник надою корів четвертої лактації був вищим, порівняно з цим показником корів першої лактації, на 8,5% ( $P<0,001$ ) і на 5% нижчим, порівняно із надоєм тварин третьої лактації. У п'ятій групі даний показник був вищим на 10,0% ( $P<0,001$ ), у шостій – на 15,0%, порівняно із цим показником у корів першої лактації ( $P<0,001$ ) та на 1,8% вище, порівняно з надоєм корів п'ятої лактації.

Достовірна різниця спостерігається і для показників живої маси тварин. Корови шостої лактації мали живу масу на 18,0% ( $P<0,01$ ) вищу, порівняно із тваринами першої лактації, а у корів третьої лактації, порівняно з коровами першої лактації, жива маса була більша на 9,8% при  $P<0,01$ .

Показники відтворювальної здатності теж змінюються залежно від лактації (табл. 4).

Таблиця 4

Зміна показників відтворювальної здатності залежно від лактації,  $\bar{X} \pm S_x$

Показник	Лактація					
	1, n=10	2, n=10	3, n=10	4, n=10	5, n=10	6, n=10
Тривалість тільності, днів	285,0±0,14	285,2±0,24	284,9±0,10	285,1±0,23	285,0±0,33	285,1±0,37
Тривалість сервіс-періоду, днів	71,6±2,18	83,1±1,95**	89,8±1,71***	75,4±2,42	84,9±1,95**	89,5±2,56***
МОП, днів	364±2,44	368,3±8,76**	380,2±2,12***	352,2±2,02**	359,6±2,33	372,9±2,42*
Тривалість сухостійного періоду, днів	80,7±1,97	52,9±1,69***	58,3±0,74***	86,5±5,20	74,2±5,74	72,8±4,917
КВЗ	0,86±0,028	1,00±0,024**	0,90±0,026	0,80±0,021	0,89±0,025	0,89±0,035

Показник тривалості сервіс-періоду тварин другої лактації достовірно переважав показник корів першої лактації на 13,8% при  $P<0,01$ . У тварин третьої лактації показник тривалості сервіс-періоду був на 20,0% ( $P<0,001$ ) вищим, порівняно із даним показником у тварин першої лактації. Також установлено, що корови п'ятої та шостої лактацій мали вірогідно вищі показники тривалості сервіс-періоду на 13,0% ( $P<0,01$ ) і 17,0% ( $P<0,001$ ), порівняно із даними показниками корів першої лактації.

Достовірна різниця спостерігається і для показника тривалості міжотельного періоду. У корів третьої лактації значення даного показника було на 4,0% вище, порівняно з тривалістю міжотельного періоду у корів першої лактації при  $P<0,001$ . Показник тривалості міжотельного періоду у корів першої лактації достовірно переважав на даним показником у корів четвертої лактації на 3,3% ( $P<0,01$ ), а у корів шостої лактації він був достовірно вищий на 2,3% ( $P<0,05$ ) порівняно з цим показником у тварин першої лактації.

Достовірна різниця для показника тривалості сухостійного періоду встановлена лише для тварин другої та третьої лактацій. Тривалість сухостійного періоду корів другої лактації була на 52,0% ( $P<0,001$ ) менше, порівняно з цим показником у корів першої лактації. Для корів третьої лактації встановлено достовірне зменшення тривалості сухостійного періоду на 38,0% ( $P<0,001$ ) порівняно з цим показником тварин першої лактації.

Аналізуючи показник коефіцієнта відтворювальної здатності корів різних лактацій, вірогідної різниці між піддослідними тваринами не встановлено. Відрізнявся лише показник корів другої лактації, який був вищим, порівняно із цим показником корів першої лактації на 0,13% при  $P<0,01$ .

Аналізуючи коефіцієнт кореляції між показниками молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів, установлено, що прямий

(позитивний) зв'язок середньої сили, наблизений до сильного встановлено між надоєм та тривалістю міжотельного і сервіс-періодів ( $0,73$  при  $P<0,05$  для обох показників) лише для тварин третьої лактації (табл. 5).

Таблиця 5

**Взаємозв'язок надою корів із показниками відтворювальної здатності залежно від лактації,  $r \pm S_r$**

Показник	Лактації					
	1, n=10	2, n=10	3, n=10	4, n=10	5, n=10	6, n=10
Жива маса, кг	-0,40 $\pm 0,323$	-0,36 $\pm 0,330$	-0,24 $\pm 0,343$	-0,06 $\pm 0,353$	0,62 $\pm 0,278$	0,44 $\pm 0,318$
Тривалість тільності, днів	0,48 $\pm 0,310$	0,41 $\pm 0,322$	0,01 $\pm 0,354$	0,08 $\pm 0,353$	-0,40 $\pm 0,324$	0,53 $\pm 0,300$
Тривалість сервіс-періоду, днів	0,10 $\pm 0,352$	0,07 $\pm 0,353$	0,73 $\pm 0,243^*$	0,10 $\pm 0,352$	0,33 $\pm 0,334$	0,18 $\pm 0,348$
МОП, днів	0,11 $\pm 0,351$	0,09 $\pm 0,352$	0,73 $\pm 0,242^*$	0,10 $\pm 0,352$	0,32 $\pm 0,334$	0,19 $\pm 0,347$
Тривалість сухо-стійного періоду, днів	0,09 $\pm 0,352$	0,32 $\pm 0,335$	0,66 $\pm 0,265^*$	0,54 $\pm 0,298$	0,47 $\pm 0,312$	0,57 $\pm 0,291$
КВЗ	-0,06 $\pm 0,353$	-0,10 $\pm 0,352$	-0,73 $\pm 0,243^*$	-0,11 $\pm 0,351$	-0,32 $\pm 0,334$	-0,17 $\pm 0,348$

Для корів третьої лактації установлено достовірний прямий (позитивний) зв'язок середньої сили між надоєм та тривалістю сухостійного періоду ( $0,66$  при  $P<0,05$ ). Кореляційний зв'язок між показниками надою та коефіцієнтом відтворювальної здатності у корів третьої лактації сильний, зворотній (негативний) і становить  $0,73$  при  $P<0,05$ . Для тварин інших лактацій між надоєм та показниками відтворювальної здатності достовірної різниці установлено не було.

Між показниками тривалості лактації та тривалості сервіс-періоду було встановлено достовірний, прямий (позитивний) зв'язок середньої сили тільки для корів третьої лактації ( $0,66$  при  $P<0,05$ ) (табл. 6).

Між всіма іншими досліджуваними показниками достовірного зв'язку встановлено не було.

Отже, з підвищеннем молочної продуктивності корів їх відтворювальна здатність у цілому погіршується. Проявляється це в збільшенні тривалості сервіс-періоду та міжотельного періоду, що негативно впливає на економічну ефективність ведення молочного скотарства. Оптимальним сервіс-періодом є показник, який становить у межах 51-90 днів, що забезпечує щорічне отримання одного теляти і більше від кожної корови. Вивчення кореляційних зв'язків між надоєм та тривалістю сервіс-періоду показало, що існує як позитивний, так і зворотній зв'язок у корів різних лактацій, що необхідно врахувати у селекційному процесі.

Таблиця 6

**Взаємозв'язок тривалості лактації корів із показниками відтворювальної здатності залежно від лактації,  $r \pm S_r$**

Показник	Лактації					
	1, n=10	2, n=10	3, n=10	4, n=10	5, n=10	6, n=10
Жива маса, кг	-0,38 $\pm 0,327$	-0,39 $\pm 0,325$	-0,18 $\pm 0,348$	-0,03 $\pm 0,353$	-0,09 $\pm 0,352$	-0,10 $\pm 0,352$
Тривалість тільності, днів	0,46 $\pm 0,314$	-0,15 $\pm 0,349$	-0,15 $\pm 0,349$	-0,37 $\pm 0,328$	-0,48 $\pm 0,310$	-0,06 $\pm 0,353$
Тривалість сервіс-періоду, днів	0,69 $\pm 0,255^*$	0,70 $\pm 0,253^*$	0,88 $\pm 0,167^{***}$	0,84 $\pm 0,194^{**}$	0,78 $\pm 0,221^{**}$	0,87 $\pm 0,175^{**}$
МОП, днів	0,69 $\pm 0,254^*$	0,70 $\pm 0,254^*$	0,88 $\pm 0,166^{***}$	0,84 $\pm 0,194^{**}$	0,78 $\pm 0,221^{**}$	0,87± 0,175**
Тривалість сухостійного періоду, днів	-0,03 $\pm 0,353$	0,26 $\pm 0,342$	0,66 $\pm 0,266^*$	-0,50 $\pm 0,306$	0,09 $\pm 0,352$	0,13 $\pm 0,351$
КВЗ	-0,69 $\pm 0,256^*$	-0,67 $\pm 0,262^*$	-0,88 $\pm 0,169^{***}$	-0,84 $\pm 0,193^{**}$	-0,76 $\pm 0,230^{**}$	-0,86 $\pm 0,180^{**}$

Економічна оцінка молочної продуктивності корів залежно від лактації корів і показників відтворювальної здатності (табл. 7) проведена за такими показниками, як середній надій на одну корову, собівартість і реалізаційна ціна одного центнера молока, валовий надій, прибуток на одну корову.

Таблиця 7

**Економічна оцінка молочної продуктивності корів залежно від лактації та показників відтворювальної здатності**

Показники	Лактація					
	1	2	3	4	5	6
n	10	10	10	10	10	10
Середній надій на одну корову, кг	6163,1	6523,3	7096,8	6736,7	6850,0	7312,7
Валовий надій молока, ц	616,3	652,3	709,7	673,7	685,0	731,3
Собівартість 1 ц молока, грн.	468,6	468,6	468,6	468,6	468,6	468,6
Реалізаційна ціна 1 ц молока, грн.	514,3	514,3	514,3	514,3	514,3	514,3
Прибуток, тис. грн.	28,2	29,8	32,4	30,8	31,3	33,4
Прибуток на одну корову, тис. грн.	2,82	2,98	3,24	3,08	3,13	3,34

Розрахунками установлено, що враховуючи лактацію корів, найбільший прибуток на одну корову був у тварин третьої і шостої лактації та становив 3,24 і 3,34 тис. грн. за лактацію. Показник третьої лактації перевищував прибуток на одну корову тварин першої лактації на 13,0%, другої – на 8,0%, четвертої – на 4,9%, п'ятої – на 3,4%, але був менший від показника шостої – на 3,1%. Показник шостої лактації перевищував прибуток на одну корову усіх дослідніх груп тварин. Порівняно з першою лактацією він був вищий на 15,6%, другої – на 12,1%, третьої – 3,1%, четвертої – на 8,4%, п'ятої – на 6,7%.

**Висновки та перспективи досліджень.** Показники молочної продуктивності вірогідно змінюються залежно від лактації. Установлено, що надій корів шостої лактації був на 15%вищим, порівняно з цим показником у корів першої лактації ( $P<0,001$ ) та на 1,8% вище, порівняно з надоєм корів п'ятої лактації. Сильним, прямим, достовірним зв'язком характеризується кореляція між тривалістю лактації та тривалістю сервіс-періоду ( $r=0,69^*-0,88^{***}$ ). Також установлено тісний, прямий, вірогідний зв'язок між тривалістю міжотельного періоду та тривалістю лактації в межах  $0,69^*-0,89^{***}$ . Між коефіцієнтом відтворювальної здатності та тривалістю лактації спостерігається зворотній тісний зв'язок ( $r=-0,69^*-0,88^{***}$ ). Це означає що зі збільшенням тривалості лактації збільшується тривалість сервіс-періоду та міжотельного періоду, але зменшується КВЗ. Установлено, що з підвищенням надою у корів другої лактації знижується коефіцієнт запліднювальної здатності ( $r=-0,73^*$ ) та збільшується тривалість сервіс-періоду. Найбільший прибуток на одну корову був у тварин третьої і шостої лактації та становив 3,24 і 3,34 тис. грн. за лактацію відповідно. Із підвищенням молочної продуктивності корів спостерігається тенденція до зниження їх відтворювальної здатності. Тому, для одержання господарством максимально можливого прибутку та раціонального ведення молочного скотарства необхідно враховувати залежність закономірностей зв'язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної здатності.

У селекційному процесі необхідно врахувати, що між молочною продуктивністю і тривалістю сервіс-періоду встановлено як позитивний, так і зворотній зв'язок у корів різних лактацій.

Не допускати у господарстві збільшення тривалості сервіс-періоду більше ніж 90 днів, що дасть змогу щороку отримувати одне теля і більше від кожної корови та утримати надій на належному рівні.

**Перспективи подальших досліджень** полягають у встановленні ступеня мінливості якісних показників молока, які не були враховані при даних дослідженнях, і установленні кореляційних зв'язків між ними і показниками відтворювальної здатності.

#### Список використаної літератури

1. Вацький В.Ф., Величко С.А. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від їх відтворювальної здатності. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2012. № 2. С. 118-122.
2. Гармаш О.І. Взаємозв'язок між продуктивністю та відтворювальною здатністю у корів червоної молочної породи. *Зоотехнія*. 2013. Т. 5. № 3-4. С. 100-106.
3. Федорович В.В. Вплив показників відтворної здатності на формування молочної продуктивності корів симентальської породи. *Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького*. 2017. Т. 19. № 74. С. 52-56.
4. Федорович С., Щербатий З., Бондар П. Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів. *Тваринництво України*. 2014. № 2. С. 38-41.

- 
5. Гиль М.І., Галушко І.А., Каратеєва О.І., Дехтяр Ю.Ф. Відтворювальна продуктивність корів голштинської породи залежно від типу формування організму. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych: monografia pokonferencyjna*. Warsawa, 2018. № 6. S. 12–16.
  6. Голубенко Т.Л. Продуктивные качества aberdin-ангус x черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-тленок». *Аграрна наука та харчові технології*. 2017. № 2(96). С. 153-158.
  7. Прудников В. Характеристика м'ясної продуктивності й шкірної сировини бичків різних типів симентальської породи при вирощуванні за технологією м'ясного скотарства. *Тваринництво України*. 2003. Вип. 1. С. 18-20.
  8. Chernenko O. M., Chernenko O. I. Economic trait of cows with different duration of prenatal growth period. *Theoretical and Applied Veterinary Medicine*. 2018. 6(3), 23-28. doi: 10.32819/2018.63005.
  9. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Польова О.Л. Формування молочної продуктивності корів залежно від віку першого отелення та ефективність її виробництва. *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. 2011. Вип. 4. Т. 3. Ч. 1. С. 85-89.
  10. Плохинський Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Київ, 1969. 256 с.
- 

### References

1. Vatskyi, V.F. & Velychko, S.A. (2012). Molochna produkty`vnist` koriv ukrayins`koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody` zalezhno vid yix vidtvoryuval`noyi zdatnosti [Milk productivity of the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed depending on their reproductive capacity]. *Visny`k Poltavs`koyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi – Bulletin of Poltava State Agrarian Academy*, 2, 118-122 (in Ukrainian).
  2. Harmash, O.I. (2013). Vzayemozv'yazok mizh produkty`vnistyu ta vidtvoryuval`noyu zdatnistyu u koriv chervonoyi molochnoyi porody` [Interrelation between the productivity and reproductive capacity in the cows of red dairy breed]. *Zootexniya – Zootechnics*, Vol. 5, 3-4, 100-106 [in Ukrainian].
  3. Fedorovych, V.V. (2017). Vply`v pokazny`kiv vidtvornoyi zdatnosti na formuvannya molochnoyi produkty`vnosti koriv sy`mental`s`koyi porody` [Impact of the indicators of reproductive capacity on the formation of milk productivity in the cows of Simmental breed]. *Naukovy`j visny`k LNUVMBT imeni S.Z. G`zhy`cz`kogo – Scientific bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after Gzhytskyi*, Vol. 19, 74, 52-56 [in Ukrainian].
  4. Fedorovych, S. & Shcherbatyi, Z. & Bondar P. (2014). Vply`v pokazny`kiv vidtvornoyi zdatnosti na molochnu produkty`vnist` koriv [Impact of the indicators of reproductive capacity on the milk productivity of cows]. *Tvary`nnyy`cztvo Ukrayiny` - Livestock Breeding of Ukraine*, 2, 38-41 [in Ukrainian].
  5. Hyl, M.I. & Halushko, I.A. & Karatieveva, O.I. & Dekhtiar, Yu.F. (2018). Vidtvoryuval`na produkty`vnist` koriv golshty`ns`koyi porody` zalezhno vid ty`pu formuvannya organizmu [Reproductive productivity of the cows of Holstein breed depending on the type of body formation]. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych: monografia pokonferencyjna*, 6, 12-16 [in Poland].
  6. Holubenko, T.L. (2017). Produkty`vny`e kachestva aberdy`n-angus x cherno-pestry`x y`sharolezsky`x telyat vy`rashhenny`x po sy`steme myasnogo skotovodstva «korova-tlenok» [Productive characteristics of Aberdeen-Angus x black-speckled and Charolais calves bred according to the system of meat cattle breeding “cow-calf”]. *Agrarna nauka ta xarchovi texnologiyi – Agrarian Science and Food Technology*, 2 (96), 153-158
-

- 
- [in Ukrainian].
7. Prudnikov, V. (2003). Xaraktery`sty`ka m'yasnoyi produkty`vnosti j shkirnoyi sy`rovyy`ny` by`chkiv rizny`x ty`piv sy`mental`s`koyi porody` pry` vy`roshhuvanni za texnologiyeyu m'asnogo skotarstva [Characteristics of meat productivity and leather raw materials in the bull-calves of different types of Simmental breed while growing under the technology of meat cattle breeding]. *Tvary`nnyy`cztvo Ukrayiny` - Livestock Breeding of Ukraine*, 1, 18-20 [in Ukrainian].
  8. Chernenko, O. M., & Chernenko, O. I. (2018). Economic trait of cows with different duration of prenatal growth period. *Theoretical and Applied Veterinary Medicine*, 6(3), 23–28. doi: 10.32819/2018.63005. [in Ukrainian].
  9. Poliovyi, L.V. & Kazmiruk, L.V. & Poliova O.L. (2011). Formuvannya molochnoyi produkty`vnosti koriv zalezhno vid viku pershogo otelennya ta efekty`vnist` yiyi vy`robny`cztva [Formation of milk productivity of cows depending on the age of the first calving and the efficiency of its production]. *Visny`k agrarnoyi nauky` Pry`chornomor`ya – Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region*, 4, 3, 85-89 [in Ukrainian].
  10. Plokhynskyi, N.A. (1969). *Rukovodstvo po byometryy dlia zootehnnykov [Biometrics guide for livestock specialists]*. Mykolaiv: Kolos [in Ukrainian].
- 

#### АННОТАЦИЯ

#### ВЗАЙМОСВЯЗЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАКТАЦИИ

Полищук Т.В., кандидат с.-х. наук, доцент  
Винницкий национальный аграрный университет

Исследована взаимосвязь и изменчивость показателей молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров в зависимости от лактации. Установлена зависимость данных показателей и их возможную смену в зависимости от лактации. Удой коров шестой лактации был на 15% выше по сравнению с этим показателем у коров первой лактации ( $P<0,001$ ) и на 1,8% выше, чем удой коров пятой лактации.

Сильной, прямой, достоверной связью характеризуется корреляция между продолжительностью лактации и продолжительностью сервис-периода ( $r=0,69^* - 0,88^{***}$ ), тесным, прямым, вероятным – между продолжительностью периода между отелами и длительности лактации в пределах  $0,69^*-0,89^{***}$ , обратным и тесным – между коэффициентом воспроизводительной способности и продолжительности лактации ( $r= -0,69^* - -0,88^{***}$ ). Данная закономерность показывает, что с увеличением продолжительности лактации увеличивается продолжительность сервис-периода и периода между отелами, но уменьшается КВЗ.

Установлено, что с повышением удоя у коров второй лактации снижается коэффициент оплодотворяющей способности ( $r= -0,73^*$ ) и увеличивается продолжительность сервис-периода. Наибольшую прибыль на одну корову получено от

животных третьей и шестой лактации и составила 3,24 и 3,34 тыс. грн. за лактацию соответственно. С повышением молочной продуктивности коров наблюдается тенденция к снижению их воспроизводительной способности. Поэтому, для получения хозяйством максимально возможной прибыли и рационального ведения молочного скотоводства необходимо учитывать зависимость закономерностей связи показателей молочной продуктивности с показателями воспроизводительной способности.

**Ключевые слова:** признаки, взаимосвязь, изменчивость, коровы, молочная продуктивность, воспроизводящая способность, удои, экономическая эффективность, прибыль

Табл. 7. Лит. 10.

#### ANNOTATION

#### **INTERRELATION AND VARIABILITY OF INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY AND REPRODUCTIVE CAPACITY OF COWS DEPENDING ON LACTATION**

**Polishchuk T.V.**, Candidate of Agricultural Science, Associate Professor  
Vinnytsia National Agrarian University

*The object of the study was the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed. The subject of the study was the indicators of milk productivity and reproductive capacity of cows.*

*In order to study the interrelation and variability of the indicators of milk productivity and reproductive capacity of cows depending on lactation, six experimental groups based on the analogue principle were formed and evaluated. Each group included 10 cows of Ukrainian black-speckled dairy breed of different lactations, among which there were the animals of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 lactations. All cows were kept on the same level, type of feeding and structure of rations under the same keeping conditions.*

*The indicators of milk productivity are likely to change depending on lactation. It was found that the milk yield in the cows of the sixth lactation was by 15% higher compared with that indicator in the cows of the first lactation ( $P<0.001$ ), and by 1.8% higher compared with the yield in the cows of the fifth lactation. The correlation between the duration of lactation and that one of the service period ( $r=0.69*-0.88***$ ) is characterized by a strong, direct and reliable link. A close, direct and probable link between the duration of intercalving period and that one of lactation in the range of  $0.69 *-0.89***$  was also established. There is a reverse close link between the coefficient of reproductive capacity and the duration of lactation ( $r=-0.69**-0.88***$ ). It means that the duration of the service and intercalving periods increases, while the coefficient of reproductive capacity decreases with the increase in the duration of lactation. It has been established that the fertility rate ( $r =-0.73*$ ) of the cows in the second lactation decreases and their service period increases with an increase in the yield. The animals of the third and sixth lactations had the largest profit per cow of 3.240 and 3.340 UAH per lactation, respectively. There is a tendency to decrease the reproductive capacity of cows with the increase in their milk productivity. Therefore, in order to obtain the maximum possible profit and rational management of dairy cattle it is necessary to take into account the dependence of the regularities of link of the indicators of milk productivity with those of reproductive capacity.*

*In the selection process it must be taken into account that both positive and reverse link between the milk productivity and the duration of the service period is determined in the cows of various lactations.*

*The farm shouldn't allow to increase the duration of the service period of more than 90 days, which will enable to receive one calf and more from each cow per year and keep the milk yield at the proper level.*

**Keywords:** signs, interconnection, variability, cows, milk productivity, reproductive capacity, hopes, economic efficiency, profit

**Tab. 7. Ref. 10.**

#### *Інформація про авторів*

**ПОЛІЩУК Тетяна Володимирівна**, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; e-mail: polischyk19@gmail.com)

**ПОЛІЩУК Татьяна Владимировна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарии, гигиены и разведения животных Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3; e-mail: polischyk19@gmail.com)

**POLISHCHUK Tetiana**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Veterinary, Hygiene and Animal Breeding (21008, 3, Soniachna Str., Vinnytsia; e-mail: polischyk19@gmail.com)